Rapport d'une Observation
Sur une playe d'arme a feu envoyée a l'academie
par Monsieur Searly Chirurgien a l'hotel Mazarin

La Malade qui fait le sujet de cette observation fut blessé par la Bourre d'un canon qui lui enleva la peau qui recouvre le tendon d'Achile de la largeur d'un écu de six francs. cette playe fut confiée pendant les douze premiers jours aux soins d'une femme qui avoit un onguent accredité. le malade ne se trouvant par mieux fit venir Mr Searly ce chirurgien trouva la playe en mauvais état le tendon d'Achile ~~etoit~~ a decouvert les bords de la playe durs et un gonflement inflammatoire qui s'étendoit depuis le gras de la jambe jusques au talon. il pansa le tendon avec l'huile de therebentine la playe avec un digestif le tout recouvert d'un cataplasme émolient, ces pansemens qui furent continués pendant plusieurs jours, ne calmerent pas l'inflammation. il survint des dépots le long du tendon d'Achile qui furent ouverts haut et bas, ~~le~~ ce tendon tomba en pourriture ~~et~~ Mr Searly le coupa au travers et en emporta la longueur de trois travers de doigt.

ARC 59 n° 116
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

avant cette operation il tira son prognostic en
avertissant le malade quand après la section des
tendons avec perte de substance, il en devoit
resulter ~~une~~ claudication. la section faite
la cicatrice fut obtenue par les moyens ordinaires
en six semaines, et au grand étonnement
du chirurgien le malade apres sa guerison
marcha sans boiter

d'après l'exposé que je viens de faire, on s'apperçoit
Mal. aisement que le traitement peu methodique de
cette plaie a été la cause des accidens qui sont
survenus, que les scarifications faites a la plaie,
la saignée, les emoliens qui avoient du être
employés par Mr Fearty, avoient ~~prostatum~~ remedié a
& ce qui auroit prevenu
l'inflammation considerable les déports consecutifs
et la pourriture du tendon qu'il a été obligé de
couper. Si cette observation n'est pas interessante
par la conduite que le chirurgien a tenue au moins
l'est-elle par rapport a l'issue de la maladie qui a
été des plus favorable, puisque Mr Fearty assure
que le malade a conservé les mouvemens d'extension
du pied comme auparavant, malgré la déperdition
de substance de trois travers de doigt du tendon d'Achilles.

nous ne voyons cependant pas que ces mouvemens se soyent rétablis dans l'espace de six semaines comme il le dit, mais qu'il a fallut un espace de tems plus considérable pour permettre aux parties de se préter et de s'étendre. ce fait, que je crois vrai, peut servir a prouver que dans les plaies du tendon d'achille avec perte de substance, on peut esperer quelquefois que le malade conservera les mouvemens d'extension par l'action des muscles jambier et peronier posterieurs qui peuvent dans ce cas suppléer en partie a l'action des muscles jumeaux soleires et plantaire, qui sont les princi paux extenseurs. je pense que l'academie peut dans l'occasion faire usage de cette observation : ——

le 6 aout 1778 Mridee